

Protokoll: Antiageing Stufe II

	Phase 1 (Peeling)	Phase 2 (Mesotherapie)	Ziel
1	Glycolic peel 70 % Retiseal		• Aufhellend. Verleiht der Haut Ausstrahlung. Stimuliert die Kollagen- und Elastinbildung. Regenerierend
2		5 ml Mesolift Cocktail 2,5 ml NCPR	• Antiaging. Lifting. Polyrevitalisierend
3	Rejuvenating Peel Retiseal		• Aufhellend. Verleiht der Haut Ausstrahlung. Antioxidativ. Für einen ebenmäßigen Hautton. Stimuliert die Kollagen- und Elastinbildung. Regenerierend
4		5 ml Mesolift Cocktail 2,5 ml NCPR	• Antiaging. Lifting. Polyrevitalisierend
5	Rejuvenating Peel		• Verjüngend. Verleiht der Haut Ausstrahlung. Antioxidativ. Für einen ebenmäßigen Hautton. Antiaging. Lifting. Polyrevitalisierend
6			• Antiaging. Lifting. Polyrevitalisierend
7		5 ml Mesolift Cocktail 2,5 ml TKN HA MW 2 %	• Antiaging. Lifting. Polyrevitalisierend. Füllend
8			

Phase 3 (Behandlung zu Hause)

Hygiene	
Behandlung	+ Total Recovery Cream (nach dem Peeling) , Ampullen Antiageing + HA, Linie Matrix Repair, Ampullen Lipo proteoglycanos (3 Mal pro Woche), Antiaging Eye contour, Clarifying Peel Booster (abends)



Phase 1

Phase 2

Phase 3

Ziele:

Das Mildern tieferer Falten, fortgeschrittener Hautalterung, sichtbarer Keratose und sichtbarer Gefäße sowie das Verdichten des Gewebes.

Kundenprofil:

Haut mittleren Alters mit fortgeschrittener Hautalterung, dehydriert, tiefere Falten mit Pigmentationsstörungen, sichtbaren Gefäßen und/oder Altersflecken

Anwendungstechniken:

MICRONEEDLING

Tiefe < 0,5 mm

1 Sitzung alle 2 Wochen

ELEKTROPORATION

Elektroporation 20'

1 Mal pro Woche

Anzahl der Sitzungen:

- 6 bis 10 je nach Hautzustand. Eine Sitzung alle 2 Monate wiederholen.

Anmerkungen:

Bei Patienten mit fortgeschrittener Hautalterung wird empfohlen, die erste Sitzung durch SPOT OUT KIT PLUS zu ersetzen und bis zur nächsten Sitzung 20 Tage zu warten.

*Bei Sitzungen mit Dermapen, bei schlaffer Haut 2 ml PIRASTINOL hinzufügen.

Vorsicht bei:

- Patienten mit Blutkrankheiten, Infektionen, Dermatosen oder Allergien und/oder bekannten Empfindlichkeiten auf die bei der Behandlung verwendeten Inhaltsstoffe sollten nicht behandelt werden, dies gilt ebenfalls für Patienten, die sich in einer gerinnungshemmenden Therapie befinden.

Ergebnisse:



Die vorliegende Information wird zu Informationszwecken bereitgestellt und ersetzt keinesfalls medizinische Information. Die vorliegenden Dokumente dürfen ausschließlich zu Informationszwecken zum persönlichen und privaten Gebrauch kopiert und vervielfältigt werden. Jegliche andere Verwendungszwecke der Kopien und Vervielfältigungen sind ausdrücklich untersagt.