

Protokoll: Moderate – ernste Narben

	Phase 1 (Peeling)	Phase 2 (Mesotherapie)	Ziel
1	Glycolic 50%	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Pirastinol (2)	• Keratolyse, Regeneration und Spenden von Feuchtigkeit
2	Purifying scrub	Regenerating cocktail (3) NCPR (2.5) Asiacen (2)	• Regenerierende, hydratisierende, antioxidative und verjüngende Wirkung
3	Glycolic 50%	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Pirastinol (2)	• Keratolyse, Regeneration und Spenden von Feuchtigkeit
4	Purifying scrub	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Asiacen (2)	• Regenerierende, hydratisierende, antioxidative und verjüngende Wirkung
5	Rejuvenating peel	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Pirastinol (2)	• Keratolyse, Regeneration und Spenden von Feuchtigkeit
6	Purifying scrub	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Asiacen (2)	• Regenerierende, hydratisierende, antioxidative und verjüngende Wirkung
7	Purifying scrub	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Pirastinol (2)	• Keratolyse, Regeneration und Spenden von Feuchtigkeit
8	Purifying scrub	Regenerating cocktail (3) RCPR (2.5) Asiacen (2)	• Regenerierende, hydratisierende, antioxidative und verjüngende Wirkung

Phase 3	Behandlung	Pflege
Hygiene	Energizing cleanser, Bamboo Hydratonic	Energizing cleanser, Bamboo Hydratonic
Behandlung	Total Recovery gel, Imperfection peel booster, Anti-ageing range, Lipo Proteoglycans ampoule, Anti-pollution total defense cream	Imperfection peel booster, Anti-pollution total defense cream, Anti-ageing und/oder Purifying Linie



TKN 360



Phase 1

Phase 2

Phase 3

Ziel:

- Korrigiert mäßige bis starke Aknenarben.

Klientenprofil:

- Haut mit Flecken und Narben infolge von Akne, mit mittelschweren oder schweren atrophischen Narben

Applicationstechniken:

- Electroporation 5-10ml – 20 min. – wöchentl.
- Microneedling 5-10ml - (0.75 -1.5mm) – 14tägig
- Manuelle Techniken

Anzahl an Sitzungen:

- 6-12 je nach Hautzustand.

Bemerkungen:

- Bei Patienten mit den Phototypen IV-VI ersetzen Sie das Glykol-Peeling durch ein Mandel-Peeling und das Rejuvenating-Peeling durch ein Photo-Ageing-Peeling.
- Nicht durchführen, wenn der Patient mit oralen Retinoiden behandelt wird.
- Verwenden Sie 15 Tage vor und nach der Behandlung den Imperfection Peel Booster.
- Beenden Sie die Behandlung mit einer topischen Anwendung aus Dexanyl und Anti-Pollution-Peel-off-Maske.

Vorsicht bei:

- Patienten mit Blutkrankheiten, Gerinnungsstörungen, Infektionen, Dermatosen, Allergien oder bekannten Überempfindlichkeiten gegenüber den verwendeten Substanzen.